

Artykuł pochodzi ze strony: [www.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie](http://www.PowiatowyInspektoratWeterynarii.wMyszkowie)

Adres artykułu: [www.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie/artykuly/44](http://www.PowiatowyInspektoratWeterynarii.wMyszkowie/artykuly/44)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZY WYSOKO ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

- depresja,
- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,
- miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe,
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek,
- silne łzawienie,
- obrzęk zatok podoczodołowych,
- kichanie,
- duszność,
- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.